

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА ДЛЯ ДОПУСКА К
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЦ, ПОЛУЧИВШИХ МЕДИЦИНСКУЮ
ПОДГОТОВКУ В ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВАХ,
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО»

ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

1. Возможный путь передачи ВИЧ-инфекции:
 - а) прием пищи из одной посуды
 - б) переливание инфицированной крови
 - в) рукопожатие
 - г) укус насекомых
2. При попадании хлорсодержащего раствора в глаза медсестры необходимо:
 - а) промыть раствором гидрокарбоната натрия
 - б) закапать раствор альбуцида
 - в) немедленно обратиться к врачу
 - г) промыть глаза проточной водой
3. Неотложная помощь при приступе стенокардии:
 - а) димедрол в/м
 - б) морфин п/к
 - в) нитроглицерин под язык
 - г) преднизолон
4. Противопоказания для промывания желудка:
 - а) желудочное кровотечение
 - б) отравление алкоголем
 - в) стеноз привратника
 - г) пищевое отравление
5. Характерный запах изо рта при гипергликемической коме:
 - а) алкоголя
 - б) аммиака
 - в) ацетона
 - г) тухлых яиц
6. Неотложная помощь при приступе бронхиальной астмы:
 - а) беродуал
 - б) дибазол
 - в) морфин
 - г) нитроглицерин
7. Основной жаропонижающий препарат в детской практике, применяющийся для борьбы с гипертермическим синдромом:
 - а) анальгин
 - б) парацетамол
 - в) пипольфен
 - г) баралгин
8. При оказании неотложной помощи ребенку с гипергликемической (диабетической) комой применяют:
 - а) инсулин
 - б) пенициллин
 - в) бисептол
 - г) фурагин
9. При переломе бедра необходимо фиксировать:
 - а) тазобедренный сустав
 - б) тазобедренный, коленный сустав
 - в) тазобедренный, голеностопный, коленные суставы
 - г) место перелома

10. Первая помощь при закрытом вывихе
 - а) наложение давящей повязки
 - б) тепло на место повреждения
 - в) транспортная иммобилизация
 - г) асептическая повязка
11. При выведении из клинической смерти необходимо:
 - а) дать понюхать нашатырный спирт
 - б) проведение ИВЛ
 - в) проведение закрытого массажа сердца
 - г) одновременное проведение ИВЛ и закрытого массажа сердца
12. При синдроме «острого живота» необходимо:
 - а) сделать очистительную клизму
 - б) ввести обезболивающее
 - в) промыть желудок
 - г) применить холод, срочно госпитализировать больного
13. Симптомы угрожающего выкидыша:
 - а) отсутствие роста матки
 - б) изменение сердцебиения плода
 - в) маточное кровотечение
 - г) повышение тонуса матки, боли в животе
14. К зависимому типу сестринских вмешательств относится:
 - а) привлечение других членов бригады
 - б) обучение пациента самоуходу и членов семьи уходу за ним
 - в) выполнение назначений врача
 - г) наблюдение за реакцией больного на лечение
15. Дезинфекция спецодежды при попадании на нее крови:
 - а) 10% осветленный раствор хлорной извести – 2 часа
 - б) 10% раствор хлорамина – 60 минут
 - в) 3% раствор хлорамина – 60 минут
 - г) 1% раствор хлорамина – 60 минут
16. Медицинская сестра приемного отделения стационара заполняет:
 - а) титульный лист медицинской карты
 - б) температурный лист
 - в) листок нетрудоспособности
 - г) лист врачебных назначений
17. Для получения порции «В» при дуоденальном зондировании через зонд вводится 30 – 50 мл:
 - а) 0,1 гистамина
 - б) мясного бульона
 - в) капустного отвара
 - г) 33% раствора магния сульфата
18. Сухие хрипы образуются при:
 - а) расклеивании альвеол
 - б) склеивании альвеол
 - в) сужении бронхов
 - г) трении листков плевры
19. Глубокая пальпация живота проводится для определения:
 - а) наличие ассиметрии живота
 - б) напряжение мышц передней брюшной стенки
 - в) положение внутренних органов
 - г) расхождения мышц передней брюшной стенки
20. Поверхностную пальпацию живота проводят с целью определения:
 - а) напряжения мышц передней брюшной стенки
 - б) положения внутренних органов
 - в) размеров внутренних органов
 - г) симптома «головой медузы»

21. Флюктуация – это:
 - а) судорожное сокращение мышц
 - б) размягчение в центре воспалительного инфильтрата
 - в) появление пузырей на гиперемированной коже
 - г) «хруст» при пальпации кожи
22. Маммография – это исследование молочных желез:
 - а) ультразвуковое
 - б) рентгенологическое
 - в) радиоизотопное
 - г) термографическое
23. При лечении гнойного бронхита применяют:
 - а) кларитромицин, бромгексин
 - б) преднизолон, эуфиллин
 - в) теофедрин, фуросемид
 - г) пентамин, дигоксин
24. Основная жалоба пациента при бронхиальной астме:
 - а) боль в грудной клетке
 - б) кашель с гнойной мокротой
 - в) приступ удушья
 - г) кровохарканье
25. Пикфлоуметрия – это определение:
 - а) остаточного объема
 - б) дыхательного объема
 - в) жизненной емкости легких
 - г) пиковой скорости выдоха
26. Повышение температуры, эндомиокардит, полиартрит наблюдаются при:
 - а) атеросклерозе
 - б) гипертонической болезни
 - в) ишемической болезни сердца
 - г) ревматизме
27. Фактор риска развития атеросклероза:
 - а) гиперхолестеринемия
 - б) занятия физической культурой
 - в) неотягощенная наследственность
 - г) рациональное питание
28. Неотложная помощь при инфаркте миокарда:
 - а) валидол
 - б) корвалол, пентамин
 - в) морфин, гепарин
 - г) папаверин, атропин
29. Перерождение язвы в рак называется:
 - а) малигнизация
 - б) пенетрация
 - в) перфорация
 - г) пилоростеноз
30. Для уточнения диагноза желчнокаменной болезни проводится:
 - а) желудочное зондирование
 - б) колоноскопия
 - в) УЗИ органов брюшной полости
 - г) цистоскопия
31. Приступ сильной боли в пояснице с иррадиацией по ходу мочеточника в паховую область:
 - а) гломерулонефрите
 - б) пиелонефрите
 - в) цистите
 - г) мочекаменной болезни

32. Неотложная помощь при почечной колике:
а) атропин, баралгин
б) дибазол, папаверин
в) кордиамин, кофеин
г) инсулин, глюкоза
33. Симптомы, характерные для железодефицитной анемии:
а) бледность кожи, трофические расстройства, извращение вкуса, одышка
б) бледность кожи, кровоизлияния, лихорадка
в) бледность кожи, кровоточивость, лихорадка, увеличение лимфоузлов
г) бледность кожи, глоссит, нарушение чувствительности
34. Неотложная помощь при гипогликемическом состоянии:
а) дибазол в/в
б) актрапид в/в
в) напоить отваром шиповника
г) напоить сладким чаем
35. Сальные железы начинают функционировать с возраста:
а) внутриутробно
б) с 2 мес.
в) с 3 мес.
г) с 4 мес.
36. Смена молочных зубов на постоянные заканчивается:
а) к 3 – 4 годам
б) 5 – 7 годам
в) 11 – 12 годам
г) 13 – 14 годам
37. Суточный объем молока для детей первых 10 мес. жизни не превышает (л):
а) 0,5
б) 1,0
в) 1,5
г) 2,0
38. Вторым прикормом для ребенка грудного возраста является:
а) фруктовый сок
б) овощное пюре
в) молочная каша
г) кефир
39. Воспаление пупочной ранки новорожденного:
а) гемангиома
б) дерматит
в) потница
г) омфалит
40. Потливость, облысение затылка у ребенка наблюдается при:
а) рахите
б) потнице
в) опрелости
г) менингите
41. Судороги при спазмофилии у детей обусловлены изменениями в крови:
а) повышением уровня железа
б) понижением уровня железа
в) повышением уровня кальция
г) понижением уровня кальция
42. К хромосомным заболеваниям относится:
а) сахарный диабет
б) ожирение
в) фенилкетонурия
г) болезнь Дауна
- С.М.*

43. При остром бронхите у детей применяют отхаркивающую микстуру с
- а) термопсисом
 - б) толокнянкой
 - в) валерианой
 - г) пустырником
44. При дегельминтизации у детей применяют
- а) бисептол
 - б) пирантел
 - в) левомицетин
 - г) супрастин
45. Зуд в перианальной области, как основной симптом гельминтоза у детей, характерен для
- а) энтеробиоза
 - б) описторхоза
 - в) аскаридоза
 - г) трихоцефалёза
46. При назначении мочегонных препаратов при гломерулонефрите в диету необходимо включить
- а) печень, мясо
 - б) овощи
 - в) курагу, изюм
 - г) кашу
47. Возбудителем ветряной оспы у детей является:
- а) вирус
 - б) стафилококк
 - в) микобактерия
 - г) шигелла
48. Ангина у детей является постоянным симптомом
- а) гриппа
 - б) ветряной оспы
 - в) скарлатины
 - г) риновирусной инфекции
49. Дезинфекция – это
- а) комплекс мероприятий, предупреждающих попадание микробов в рану
 - б) уничтожение всех микроорганизмов, в том числе и спорообразующих
 - в) уничтожение патогенных микробов, кроме спорообразующих
 - г) механическое удаление микроорганизмов с поверхности изделий медицинского назначения
50. Физический метод окончательной остановки кровотечения
- а) переливание плазмы
 - б) протезирование сосуда
 - в) электрокоагуляция
 - г) наложение шва на сосуд
51. Повязку Дезо используют при переломе
- а) костей предплечья
 - б) грудины
 - в) ключицы
 - г) рёбер
52. К твёрдым повязкам относится
- а) бинтовая
 - б) гипсовая
 - в) клеевая
 - г) давящая
53. Инструмент, разъединяющий ткани:
- а) бельевые зажимы
 - б) корнцанг
 - в) зажим Кохера
 - г) скальпель

54. Комбинированная травма – это
- а) сочетание двух и более повреждающих факторов
 - б) повреждение одного сегмента конечности
 - в) перелом бедра и голени
 - г) разрыв мочевого пузыря и перелом костей таза
55. Вид раны, где чаще возможно повреждение костей:
- а) лоскутная
 - б) рубленая
 - в) колотая
 - г) резаная
56. При ушибе головного мозга сознание чаще всего
- а) утрачивается после «светлого промежутка»
 - б) утрачивается на несколько секунд или минут
 - в) ясное
 - г) утрачивается на длительное время
57. Лимфаденит – это воспаление
- а) потовых желёз
 - б) лимфатических узлов
 - в) лимфатических сосудов
 - г) сальных желёз
58. Осложнение сепсиса:
- а) анафилактический шок
 - б) септический шок
 - в) септицемия
 - г) травматический шок
59. Показания для введения противогангренозной сыворотки:
- а) закрытый перелом костей голени
 - б) пандактилит
 - в) абсцесс лёгкого
 - г) обширные повреждения мягких тканей с разможжением
60. Возможное осложнение варикозного расширения вен нижних конечностей:
- а) кровотечение
 - б) перемежающаяся хромота
 - в) сухая гангрена
 - г) отёк тканей
61. Признак, характерный для доброкачественной опухоли:
- а) прорастание в окружающие ткани и регионарные лимфоузлы
 - б) чёткие границы опухоли, метастазы не даёт
 - в) развитие кахексии
 - г) микроскопически – «атипичные клетки»
62. Основной метод лечения злокачественных опухолей:
- а) химиотерапия
 - б) оперативное лечение
 - в) гормонотерапия
 - г) комбинированный
63. Геморрой может осложниться
- а) тромбозом геморроидальных узлов
 - б) воспалением кожи вокруг анального отверстия
 - в) дерматитом
 - г) диспепсией
64. При проведении наружного массажа сердца ладони следует расположить
- а) на верхней трети грудины
 - б) на границе верхней и средней трети грудины
 - в) на границе средней и нижней трети грудины
 - г) в пятом межрёберном промежутке слева

65. ИВЛ новорожденному желательно проводить
- методом «рот ко рту»
 - с помощью маски наркозного аппарата
 - методом «рот к носу»
 - методом «рот ко рту и носу»
66. Препарат, применяемый при асистолии:
- кордиамин
 - дроперидол
 - адреналин
 - фуросемид
67. Основной принцип оказания медицинской помощи в очаге чрезвычайной ситуации:
- преемственность
 - непрерывность
 - своевременность и полнота первой медицинской помощи
 - последовательность
68. Острая плацентарная недостаточность возникает вследствие
- наличия гестоза
 - отслойки плаценты
 - многоводия
 - узкого таза
69. Гипотония матки в послеродовом периоде чаще всего обусловлена
- перерастяжением матки (многоводие, многоплодие, крупный плод)
 - отсутствием аборт в анамнезе
 - наличием гипертонии
 - анемией
70. Для общеравномерносуженного таза характерно
- тупой верхний угол ромба Михаэлиса
 - наличие деформаций таза
 - тонкость костей таза
 - уменьшение всех размеров таза
71. Для кровотечения при предлежании плаценты характерно:
- массивность, длительность
 - волнообразность, цвет крови алый, безболезненность, беспричинность
 - цвет крови тёмный
 - болезненность
72. Парный трубчатый орган яйцевод – это
- семявыносящие протоки
 - слуховые трубы
 - мочеточники
 - маточные трубы
73. Восходящая гонорея – это поражение
- бартолиновых желёз
 - влагалища
 - матки и маточных труб
 - уретры
74. Ановуляторные дисфункциональные маточные кровотечения чаще встречаются
- после родов
 - в климактерическом периоде
 - после аборта
 - в репродуктивном возрасте
75. Головная боль мышечного напряжения характерна для
- шейного остеохондроза
 - гипертонической болезни
 - мигрени
 - менингита

76. Заболевание, осложняющееся коматозным состоянием:
- а) язвенная болезнь желудка
 - б) ишемическая болезнь сердца
 - в) гипертоническая болезнь
 - г) сахарный диабет
77. Пути заражения при вирусном гепатите А:
- а) фекально-оральный
 - б) половой
 - в) внутриутробный
 - г) контактный
78. Сахарный диабет у лиц пожилого и старческого возраста обусловлен
- а) бактериальной инфекцией
 - б) психоэмоциональными перегрузками
 - в) абсолютным дефицитом инсулина
 - г) снижением чувствительности тканей к инсулину
79. Детям до 8 лет противопоказан
- а) оксациллин
 - б) пенициллин
 - в) тетрациклин
 - г) эритромицин
80. При лечении бронхиальной астмы применяют ингаляционный глюкокортикостероид
- а) астмопент
 - б) беротек
 - в) беклометазон
 - г) сальбутамол
81. При приёме препаратов висмута кал окрашивается в цвет
- а) белый
 - б) жёлтый
 - в) красный
 - г) чёрный
82. Механизм заражения при кишечных инфекциях:
- а) аэрогенный
 - б) фекально-оральный
 - в) трансмиссивный
 - г) вертикальный
83. Специфическая профилактика вирусного гепатита «В»:
- а) вакцинация
 - б) применение эубиотиков
 - в) стерилизация мед. инструментария
 - г) использование одноразового инструментария
84. Признак менингококкцемии:
- а) головная боль
 - б) менингеальные симптомы
 - в) геморрагическая звёздчатая сыпь
 - г) повышение АД
85. Причина геморрагического инсульта:
- а) симптоматическая артериальная гипертония
 - б) шейный остеохондроз
 - в) сахарный диабет
 - г) ревматизм
86. Патологические рефлекс характерны для
- а) вялого паралича
 - б) спастического паралича
 - в) менингита
 - г) энцефалита

87. Клинические признаки стафилодермии:
- а) приуроченность пустул к сальным и потовым железам
 - б) приуроченность пустул к складкам кожи
 - в) дряблая покрывка пустул
 - г) жидкий гной
88. Реакция, не используемая для диагностики сифилиса:
- а) Борде-Жангу
 - б) Вассермана
 - в) иммобилизации бледных трепонем (РИБТ)
 - г) иммунофлюоресценции (РИФ)
89. Фарингоскопия – это осмотр
- а) глотки
 - б) носа
 - в) уха
 - г) гортани
90. Охриплость голоса или афония – ведущий признак
- а) среднего отита
 - б) острого ринита
 - в) ларингита
 - г) заглоточного абсцесса
91. Симптомом, характерным для конъюнктивита является
- а) отёк век
 - б) гиперемия век
 - в) перекорниальная инъекция сосудов
 - г) гиперемия конъюнктивного свода
92. При ожоге глаз кислотой необходимо
- а) промыть глаза водой 10 – 20 минут и 0,1% раствором уксусной кислоты
 - б) промыть глаза водой 10 – 20 минут и 2% раствором гидрокарбоната натрия
 - в) закапать в конъюнктивальную полость 30% раствор сульфацил-натрия и ввести мазь с антибиотиком
 - г) ввести в конъюнктивальную полость мазь с антибиотиком
93. Методы стерилизации стоматологических инструментов:
- а) кипячение, паровой метод
 - б) ионизирующее излучение
 - в) химический метод
 - г) паровой, воздушный, химический
- 94 Первая помощь при травмах челюстей заключается в
- а) наложении круговой повязки, остановке кровотечения
 - б) очищении полости рта, остановке кровотечения, совмещении отломков челюстей, наложении повязки
 - в) введении обезболивающих, наложении повязки, остановке кровотечения
 - г) остановке кровотечения, наложении круговой повязки
95. Наиболее ранний срок обнаружения антител к ВИЧ составляет
- а) 1 день
 - б) 1 неделя
 - в) 2 недели
 - г) 3 – 4 недели
96. СПИД – определяющим заболеванием является
- а) дизентерия
 - б) пневмоцистная пневмония
 - в) стафилококковая инфекция
 - г) грипп

97. Для обработки слизистых при загрязнении их кровью используется
- а) 96% спирт
 - б) 5% р-р йода
 - в) 0,05% р-р марганцевокислого калия
 - г) 3% р-р перекиси водорода
98. Мощность стационара определяется
- а) численностью обслуживаемого населения
 - б) количеством коек
 - в) количеством работающих врачей
 - г) уровнем технической оснащённости
99. Для профилактики рахита применяется
- а) ИКЛ
 - б) УВЧ – терапия
 - в) общее УФО
 - г) электрофорез
100. Положение пациента при массаже спины – это
- а) лёжа на животе, руки вверх
 - б) лёжа на животе, руки вдоль туловища
 - в) лёжа на боку
 - г) стоя

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ

1-Б	38-В	75-А
2-Г ✓	39-Г	76-Г
3-В	40-А	77-А
4-А	41-Г	78-Г
5-В	42-Г	79-В
6-А	43-А	80-В
7-Б	44-Б	81-Г
8-А	45-А	82-Б
9-В	46-В	83-А
10-В	47-А	84-В
11-Г	48-В	85-А
12-Г	49-В	86-Б
13-Г	50-В	87-А
14-В	51-В	88-А
15-В ✓	52-Б	89-А
16-А	53-Г	90-В
17-Г	54-А	91-Г
18-В	55-Б	92-Б
19-В	56-Г	93-Г
20-А	57-Б	94-Б
21-Б	58-Б	95-В
22-Б	59-Г	96-Б
23-А	60-А	97-В
24-В	61-Б	98-Б
25-Г	62-Г	99-В
26-Г	63-А	100-Б
27-А	64-В	
28-В	65-Г	
29-А	66-В	
30-В	67-В	
31-Г	68-Б	
32-А	69-А	
33-А	70-Г	
34-Г	71-Б	
35-А	72-Г	
36-В	73-В	
37-Б	74-Б	